

TH4+, konc. Tirpalas

ATC vet. kodas QV07A V

Registracijos žymuo: RV 97/0526/6

Baktericidinis, virusocidinis, fungicidinis preparatas gyvulininkystės patalpų, ž. ū. produktų sandėlių, viešo naudojimo patalpoms dezinfekuoti

SUDĖTIS. 1 litre tirpalo yra:

didecildimetilamonio chlorido	18,75 g,
dioktildimetilamonio chlorido	18,75 g,
oktildecilbenzilamonio chlorido	37,5 g,
alkildimetilbenzilamonio chlorido	50 g,
gliutaraldehido	62,5 g,
pušų aliejaus	20 g,
terpeninių medžiagų	20 g,
užpildo iki	1 l.

SAVYBĖS. Ketvirtinių amonio, terpeninių darinių ir aldehido mišinys suteikia TH4+ stiprų baktericidinį, fungicidinį ir virusocidinį bei dezodoruojantį veikimą. Tirpalo sudėtinių medžiagų sinergetinis veikimas labai išplečia veikimo spektrą ir neleidžia atsirasti mikroorganizmų rezistentiškumui. TH4+ lieka aktyvus kietame ir organinių medžiagų turinčiame vandenyje. TH4+ veikliosios medžiagos yra sąrašė medžiagų, leidžiamų naudoti maisto pramonės patalpose. Preparato cheminė sudėtis pateikta apsinuodijimų centuri.

PASKIRTIS. Gyvulininkystės patalpoms, ž. ū. produktų sandėliams, viešo naudojimo patalpoms dezinfekuoti.

NAUDOJIMAS IR DOZĖS. TH4+ naudojamas pulverizacijos, aspersijos ar suvilgymo būdais, prieš tai atskiedus vandeniu dozėmis nurodytomis žemiau. Galima naudoti esant patalpose gyvuliams (nelieti ant jų). Pulverizacijai imama 0,3 l skiesto tirpalo 1 m².

Aerozolinei dezinfekcijai skiriama 5 ml tirpalo 1 m³.

Pulverizacijai garo pagalba (nebulizacijai) TH4+:

— 2,5 ml/ m³ kai ekspozicijos laikas 4 val. (arba 7,5 l 3 000 m³ arba maždaug 1 000 m²).

— 1,5 ml/ m³ kai ekspozicijos laikas 6 val. (arba 4,5 l 3000 m³ arba maždaug 1 000 m²).

Pulverizacija garo pagalba turi būti vykdoma hermetiškai uždarytose patalpose, sustabdžius ventilaciją.

TH4+ gali būti naudojamas su putų generatoriumi, tik šiuo atveju reikia pridėti tą patį kiekį putojančios medžiagos (pvz., Automousse).

Maisto pramonės patalpose, po dezinfekcijos viską reikia būtinai nuplauti vandeniu.

Einamajai dezinfekcijai TH4+ naudojamas 0,5 % koncentracijos. Žemiau nurodytos koncentracijos, priklausomai nuo dezinfekuojamų patalpų ir norimo apdoravimo rūšies. Koncentracija gali būti padidinta priklausomai nuo situacijos, pvz., epidemijų, sunkios patologijos, aplinkos mikrobino užterštumo padidėjimo atvejais.

1. Gyvulių laikymo patalpos:	baktericidiniams ir fungicidiniams poveikiui — 0,5 %, virusocidiniams poveikiui — 2 %.
2. Gyvulių transportavimo priemonės:	baktericidiniams ir fungicidiniams poveikiui — 0,5 %, virusocidiniams poveikiui — 2 %.
3. Gyvulių apyvokos reikmenys:	baktericidiniams ir fungicidiniams poveikiui — 0,5 %, virusocidiniams poveikiui — 2 %.
4. Pašarų transportavimo priemonės:	baktericidiniams poveikiui — 0,1 %, fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
5. Pašarų ruošimo patalpos:	baktericidiniams poveikiui — 0,1 %, fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
6. Gyvulinės kilmės produktų sandėliai:	baktericidiniams poveikiui — 0,1 %, fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
7. Gyvulinės kilmės produktų transportavimo priemonės:	baktericidiniams poveikiui — 0,1 %, fungicidiniams poveikiui — 0,5 %, virusocidiniams poveikiui — 5 %.
8. Augalinės kilmės produktų sandėliai:	fungicidiniams poveikiui — 1 %.
9. Grūdinių ir jų produktų sandėliai:	fungicidiniams poveikiui — 1 %.
10. Galvijų ir kiaulių fermų pašarų saugyklos:	fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
11. Bulvių saugyklos:	fungicidiniams poveikiui — 1 %.
12. Drėgnos ir šiltos paukštidės:	fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
13. Endivo salotų auginimo vietos:	fungicidiniams poveikiui — 1 %.
14. Pelėšiai pieno ir sūrių gamybos pramonėje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus:	fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
15. Alaus, kitų gėrimų, konservų gamybos vietos:	fungicidiniams poveikiui — 1 %.
16. Šiltnamiai ir sodininkystės vietos:	fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
17. Vaisių ir daržovių saugyklos:	fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.
18. Mėsos ir jos produktų šaldytuvai:	fungicidiniams poveikiui — 0,5 %.

SAUGOS PRIEMONĖS. Nemaišyti su jokių kitų produktų, iš anksto nepasikonsultavus su gamintoju. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis patekimo į organizmą. Vengti kontakto su oda ir akimis (dirgina akis ir odą). Koncentruotą tirpalą pilstyti su pirštinėmis ir akiniais. Patekus ant odos ar į akis tučtuojau nuplauti vandeniu (patekus į akis, kreiptis į gydytoją). Naudojant pulverizaciją su garu, nestatyti nebulizacijos aparato arti lengvai užsidegančių medžiagų.

PAKUOTĖ. Tirpalas indais po 1, 5, 10, 25, 60 ir 200 litrų.

TINKAMUMO LAIKAS.

REGISTRUOTOJAS IR GAMINTOJAS. Sogeval, Prancūzija.

IMPORTUOTOJAS. UAB "Vetfarmas"